Biotoptypen

Laubwald, Kleingehölze

- AB1 Buchen-Eichenmischwald
- AU0 Aufforstung
- BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten
- BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
- BB2 Einzelstrauch
- BD0 Hecke
- BD3 Gehölzstreifen
- BD6 Baumhecke, ebenerdig
- BE0 Ufergehölz
- BF3 Einzelbaum
- BG1 Kopfbaumreihe
- BH0 Allee

Röhrichte

- CD0 Rasen-Großseggenried
- yCD0 Großseggenried
- yCF2 Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten

Grünland, Brachen

- EA0 Fettwiese
- EB0 Fettweide
- ED2 Magerweide
- EE3 Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland
- xEA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese)
- yEC2 Nass- und Feuchtweide
- yEC5 Flutrasen

Pionierstandorte

- GF0 Vegetationsarme oder -freie Bereiche

Gewässer

- FG0 Abgrabungsgewässer
- FD0 Stehendes Kleingewässer
- FN0 Graben
- zFC5 Auenkolk, Woye
- yFD2 Blänke
- yFD0 Stehendes Kleingewässer
- yFF0 Teich

Zusatzcodes

- x = FFH-Lebensraumtyp
- y = geschützer Biotop nach § 42 LNatschG NRW.
- z = sowohl FFH-LRT, als auch geschützer Biotop nach § 42 LNatschG NRW.

Pflanzengesellschaften Grünland

- Vegetationsgesellschaften 2011
- C3 Zusatzcode Pflanzengesellschaft

Fundpunkte Rote-Liste-Arten

- 4 punktuelles Vorkommen wertgebender Pflanzenarten. Fundpunkt mit entsprechender Nummierung (siehe dazu Tab. 7).

- NSG-Grenze
- FFH-Grenze

Maßstab: 1:5.000

0 50 100 200 Meter

N

Zusatzcodes Pflanzengesellschaften Grünlandvegetation 2011

A/C:	Feldgrasanbau mit Lolium-Einsaat
A3:	Frische Glatthaferwiese (Dauco-Arrhenatheretum typicum)
A4:	Mäßig feuchte Glatthaferwiesen (Dauco-Arrenatheretum typicum), Variante von Alopecurus pratensis, verbracht
A5A Br:	Fuchsschwanz-Frischwiese (Arrhenatheretalia Faz. v. Alopecurus pratensis)
C2:	Trockene Weidelgras-Weißkleeweide (Lolio-Cynusuretum plantaginosetum mediae)
C23:	Var. v. Eryngium campestre, typ. Subvariante
C3:	Reine Weidelgras-Weißkleeweide (Lolio-Cynosuretum typicum), typische Variante
C30:	Frische Weidelgras-Weißkleeweide (Lolio-Cynosuretum typicum), Fragmentgesellschaft
C4:	Mäßig feuchte Weidelgras-Weißkleeweide (Lolio-Cynosuretum typicum), Variante von Cardamine pratensis
C5:	Feuchte Weidelgras-Weißkleeweide (Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi
I70 Br:	Zweizeilige Segge (Carex disticha), verbracht
K40:	Queckenrasen (Agropyron repens)
K41:	Waldsumpfkresse-Flechtstraußgrasrasen (Rorippo-Agrostidetum typicum)
K5o:	Reiner Knickfuchsschwanzrasen (Ranuculo-Alopecuretum typicum)
K6o:	Knickfuchsschwanzrasen mit Flutschwaden (Ranunculo-Alopecuretum glycerietosum fluitantis
K7o:	Brennhahnenfuß-Nassweide (Ranuculo-Alopecuretum ranunculetosum flammulae)
M-Cg:	Schlankseggenried (Cariecetum gracilis)
P9:	Röhricht (Phragmition)

Maßnahmenkonzept

NSG Salmorth, nur Teilflaeche "Rindernsche Kolke"

DE-4102-302

Bestandskarte Biotoptypen

NABU Naturschutzstation Niederrhein

Kreis Kleve ... mehr als niederrhein

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Fachliche Bearbeitung: Jonas Linke (NABU-Naturschutzstation Niederrhein) Kartenerstellung: Jonas Linke	Bearbeitung: Fachbereich 23, J. Schäpers Kartographie: G. Legat, K. Fleckenstein Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32 N	Stand: 03.07.2020 Maßstab: 1:5.000 © Topographische Karten: Bez. Reg. Köln, Abt. GEObasis NRW, Bonn 2012