



Legende

Vegetationseinheiten

- Ackerfrauenmantel-Gesellschaften (Aphanenion arvensis)
- Ackerfrauenmantel-Gesellschaften (Aphanenion arvensis) (Brache)
- Berg-Glatthaferwiese (Alchemillo-Arrhenatheretum)
- Berg-Glatthaferwiese (Alchemillo-Arrhenatheretum) (Brache)
- Besengirster-Heide (Calluno-Sarothamnetum, Ausb. mit Thymus pulegioides)
- Feuchte Berg-Glatthaferwiese (Alchemillo-Arrhenatheretum lychnetosum)
- Feuchte Berg-Glatthaferwiese (Alchemillo-Arrhenatheretum lychnetosum) (Brache)
- Feuchte Rotschwingel-Straußgrasweide (Alchemillo-Cynosuretum lutetosum)
- Goldhaferwiese (Geranio-Trisetetum)
- Kohldiestelwiese (Angelico-Cirsietum oleracei polygonetosum)
- Kohldiestelwiese (Angelico-Cirsietum oleracei) (Brache)
- Kreuzblumen-Borstgrasrasen (Polygalo-nardetum, Ausb. mit Succisa pratensis u. Galium verum)
- Neueinsaat
- Rotschwingel-Straußgrasweide (Alchemillo-Cynosuretum)
- Waldbinsenwiese (Crepido-Juncetum acutiflori)
- Waldbinsenwiese (Crepido-Juncetum acutiflori) (Brache)
- Mähweide (Kennarten von Arrhenatherion zum Cynosurion)
- Wiesenknöterich-Engelwurzweide (Polygonum bistorta-Gesell.)
- Wiesenknöterich-Engelwurzweide (Polygonum bistorta-Gesell.) (Brache)